



Instruções para a Pós-operatório IV Sedação

Hoje, seu filho teve tratamento odontológico sob sedação IV

As crianças respondem a sedação, em sua própria maneira, mas as seguintes orientações podem ajudar a saber o que esperar durante as próximas 24 horas.

1. Os outros adultos que você trouxe com você pode se concentrar na condução. Nós recomendamos que você cuide de seu filho quando ele / ela está no banco do carro.
2. Depois casa, seu filho vai ser ainda sonolento e deve permanecer sob supervisão adulta até plenamente recuperado dos efeitos da sedação. Se seu filho quer dormir, a posição o seu filho sobre o seu lado com a cabeça e apoiou o queixo para cima. Durante este período, verifique a sua respiração da criança e das vias aéreas a cada 3-5 minutos. Se o seu filho é ronco, o posicionamento da cabeça até o ronco desaparece e seu filho respira normalmente. Se o seu filho dorme mais do que 4 horas por favor despertar-lhe suavemente. Se respiração se torna anormal ou você não é capaz de despertar o seu filho contacto 911 imediatamente.
3. Náuseas e vômitos ocasionais são os efeitos secundários da sedação. Se ocorrer vômito, imediatamente claro o material da boca do seu filho. Mais uma vez, certifique-se a respiração é normal. Se respiração se torna anormal ou você não é capaz de despertar a criança, chamada 911 imediatamente. Se vômito persiste por 20-40 minutos, entre em contato com nosso escritório imediatamente.
4. Seu filho não deve desempenhar qualquer atividades potencialmente perigosas, como andar de bicicleta, jogar fora desacompanhados, movimentação objetos, trabalhando com ferramentas ou brinquedos ou subir escadas até que ele / ela está de volta ao seu habitual atenção e coordenação.
5. Crianças podem ser irritado após o tratamento. Se você acha que é a irritabilidade causada pelo desconforto que você pode dar o seu filho acetaminophen (Tylenol) ou ibuprofeno (Motrin, Advil). Siga as instruções na garrafa para dosagem com base na idade da criança / peso.
6. Quando a criança está alerta, você pode dar a ele / ela SIPs clara de líquidos para evitar desidratação e náuseas. Pequenas bebidas tomadas repetidamente são preferíveis a grandes quantidades. A primeira refeição deve ser algo leve e de fácil digestão (por exemplo, sopa, gelatina, maçã molho). Não dê alimentos picantes ou gordos (por exemplo, batatas fritas, tacos, salsa, leite, queijo ou iogurte).
7. Uma ligeira febre (temperatura de 100.5 F) não é incomum após sedação. Você pode dar o seu filho acetaminophen (Tylenol) ou ibuprofeno (Motrin, Advil). Siga as instruções na garrafa para dosagem com base em sua idade da criança / peso. Porque desidratação pode causar um ligeiro aumento de temperatura, pode ajudar a limpar fluidos corrigir esta condição. Se uma maior febre desenvolve ou se a febre persistir chamar nosso escritório.
8. Sinta-se livre para ligar para o escritório para quaisquer dúvidas ou preocupações que você possa ter.

Dental Kidz (empresas e após horas): 973-391-1000