



Post-operatorio Instrucciones Sedación oral

Hoy en día, su hijo había tratamiento dental incluyendo un sedante para ayudar a la calma durante el tratamiento. Él o ella recibió la siguiente sedante (s):

Chloral Hydrate Diazepam Meperidine

Midazolam Hydroxyzine

Los niños responden a la sedación según sus propias características, pero las siguientes pautas pueden ayudarlo a saber qué esperar durante las próximas 24 horas.

1. El otro adulto que viene con usted puede concentrarse en conducir. Le recomendamos que cuide de su hijo mientras se encuentre en el asiento del automóvil.
2. Al llegar a casa, el niño aún se sentirá somnoliento y debe permanecer bajo supervisión adulta hasta recobrar totalmente de los efectos de la sedación. Si su hijo desea dormir, colóquelo de costado con algún soporte bajo la cabeza y el mentón hacia arriba. Durante este período, verifique la respiración y vías respiratorias del niño cada 3-5 minutos. Si el niño ronca, vuelva a acomodarle la cabeza hasta que el ronquido desaparezca y el niño respire normalmente. Si el niño duerme por más de 4 horas, despiértelo suavemente. Si la respiración se vuelve anormal o no puede despertar a su hijo, llame al 911 de inmediato.
3. Las náuseas y los vómitos son efectos secundarios ocasionales de la sedación. Si hay vómitos, limpie inmediatamente el material de la boca de su hijo. Nuevamente, asegúrese de que la respiración sea normal. Si la respiración se vuelve anormal o no puede despertar a su hijo, llame al 911 de inmediato. Si los vómitos persisten por 20-40 minutos, comuníquese con nuestro consultorio de inmediato.
4. Su hijo no debe realizar ninguna actividad potencialmente peligrosa como andar en bicicleta, jugar afuera sin supervisión, manipular objetos filosos, trabajar con herramientas o juguetes o subir escaleras hasta que vuelva a tener su alerta y coordinación habituales.
5. Los niños pueden sentirse irritables luego del tratamiento. Si usted cree que la irritabilidad es causada por molestias, puede darle acetaminophen (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin, Advil). Para la dosis, siga las instrucciones del envase según la edad/peso de su hijo.
6. Una vez que su hijo esté despierto, puede darle pequeños sorbos de líquidos claros para evitar las náuseas y la deshidratación. Es preferible que beba en tragos cortos y no en tragos largos. La primer comida debe ser algo liviano y fácilmente digerible (por ej. una sopa, gelatina, jugo de manzana). No le de alimentos grasosos o condimentados (por ej. papas fritas, tacos, salsa, leche, queso o yogur).
7. Es posible que pueda tener un poco de fiebre (temperatura a 100.5F) después de la sedación. Puede darle acetaminophen (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin, Advil). Para la dosis, siga las instrucciones del envase según la edad/peso de su hijo. Dado que la deshidratación puede producir un leve aumento de la temperatura, los líquidos claros pueden ayudarlo a corregir esta condición. Si se desarrolla una fiebre más alta o si la fiebre persiste, llame a nuestro consultorio.
8. Siéntase libre de llamar a nuestro consultorio por cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.